



Fortalecendo Capacidades na Floresta Atlântica Brasileira: o caso do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica

Dr. Severino Rodrigo Ribeiro Pinto



- Introdução
- O papel do Pacto para a consolidação de uma agenda de fortalecimento de capacidades na MA
- Estudo de Caso – Corredor de Biodiversidade do Nordeste



Condicionantes – Demandas

Initiative 20



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
DETENDIDA CONTRIBUIÇÃO NACIONALMENTE DETERMINADA
PARA CONSECUIÇÃO DO OBJETIVO DA
CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇA DO CLIMA

Em conformidade com as decisões 1/CP.19 e 1/CP.20, o Governo da República Brasil tem a satisfação de comunicar ao Secretariado da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) sua pretendida contribuição nacionalmente determinada (CND) para o período de 2013-2020, denominada Contribuição Nacionalmente Determinada (CND) do Brasil.

Contribuição Nacionalmente Determinada (CND) do Brasil.
51, de 25 de maio de 2012,



Presidência
Subchefia para
LEI Nº 12.851, DE 25 DE

[Texto compilado](#)
[Mensagem de veto](#)

Di
de
se
de

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte

CAPÍTULO
DISPOSIÇÕES




O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da






**OS PRAZOS ARE
COMING!!!!**





PACTO
PELA RESTAURAÇÃO DA
MATA ATLÂNTICA

Fases Conceituais da Restauração Florestal no Brasil



CAPÍTULO 7

MUCHO MÁS ALLÁ DE LA FORESTA: LOS IMPACTOS SOCIO-ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN LA MATA ATLÁNTICA DE BRASIL


Luisa Santiago Lemgruber
Jerónimo Boelsums B. Sansevero
Ana Castro
Helena Alves Pinto
Agnieszka Latawiec
alatawiec@gmail.com
Bernardo Strassburg
Pedro Brancalion
Ricardo Ribeiro Rodrigues
Severino Pinto


INTRODUCCIÓN

La pérdida de hábitat causada por la deforestación es una de las mayores amenazas para la biodiversidad (Scheffer et al., 2001). Las estimaciones muestran que cada año más de tres millones de hectáreas de bosque son deforestadas en el mundo. Las regiones con las mayores


pérdidas se encuentran en América Latina, el Caribe y África (FAO, 2010). Sólo en América del Sur durante el periodo de 2000 a 2010, aproximadamente cuatro millones de hectáreas fueron deforestadas por año (FAO, 2010). Además de los impactos directos causados por la deforestación (por ejemplo, extinción de especies, degradación del suelo, etc.)

Cadeia produtiva da restauração





Estudo de Caso





especies, a Mata Atlântica do Nordeste é uma das regiões mais críticas do mundo e, para garantir a conservação dessa importante região a longo prazo temos que agir rapidamente, em diferentes escalas, com embasamento científico e através de parcerias e alianças fortes entre as diversas atores da sociedade, como aqui você e todos que envolvidos a restauração dessa Guia. Esta publicação lança as bases para o desenvolvimento de um novo modelo para a Mata Atlântica do Nordeste. Alvo da recuperação da vegetação nativa, espera-se resgatar e valorizar novamente a cultura florestal, promover o uso sustentável das recursos naturais e proteger o ecossistema biodiversidade desta região.

Luiz Paulo de Sousa Pinto
Comissão Internacional

Este Guia Prático é um dos produtos do projeto "Modelos de Reflorestamento para a Zona da Mata", financiado pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco – PROZAMA. O seu principal objetivo é ser uma ferramenta de consulta para o planejamento e implementação de reflorestamentos com alta diversidade biológica na floresta Atlântica do Nordeste do Brasil (Zona da Mata). Esta obra possui uma leitura importante e tem valor estratégico, na medida em que estimula e permite uma mudança significativa nas práticas de reflorestamento com espécies nativas na floresta da Mata Atlântica nordestina; desta forma, contribuir para a restauração da biodiversidade regional e proteção da enorme diversidade biológica.

Este guia também contém diretrizes básicas capazes de oferecer suporte para a elaboração de uma legislação reguladora das práticas de reflorestamento, as quais devem priorizar para eficiência, garantia de benefícios (ambientais, sociais e econômicos) e suporte legal para os diversos atores envolvidos na ocupação da floresta e adaptação ambiental de atividades produtivas (educação de passivos ambientais). A floresta Atlântica ao norte do rio São Francisco é atualmente um dos trechos de floresta tropical mais ameaçados do mundo, restando menos de 3% de sua cobertura original. Permitir que esta floresta preste serviços ambientais estratégicos, proteja o patrimônio biológico da floresta Atlântica brasileira e ajude no desenvolvimento sustentável da região é uma tarefa que não pode mais ser adiada e necessita do envolvimento de toda a sociedade.

ISBN 978-85-09057-03-4



Implementando Reflorestamentos com Alta Diversidade na Zona da Mata Nordestina

Guia Prático



Implementando Reflorestamentos com Alta Diversidade na Zona da Mata Nordestina

Guia Prático



Cecília P. Alves-Costa | Diêta Lúcio | Tercio Lúcio | Pedro M. S. Brancalini | André G. Nave
Sergius Gandolfi | André M. M. Santos | Ricardo Ribeiro Rodrigues | Marcílio Tabarelli

Implementando Reflorestamentos com Alta Diversidade na Zona da Mata Nordestina

O Nordeste Brasileiro é considerado uma das regiões mais críticas do mundo, tanto por causa da pobreza e da baixa produtividade agrícola, quanto por causa da perda de biodiversidade e da degradação ambiental. O que ocorre no Nordeste é uma perda de biodiversidade e, sobretudo, pela perda de cultura ancestral. O que ocorre no Nordeste é uma perda de biodiversidade e, sobretudo, pela perda de cultura ancestral. O que ocorre no Nordeste é uma perda de biodiversidade e, sobretudo, pela perda de cultura ancestral.

Uma das principais causas da perda de biodiversidade é a perda de habitat. A perda de habitat é a principal causa da perda de biodiversidade. A perda de habitat é a principal causa da perda de biodiversidade. A perda de habitat é a principal causa da perda de biodiversidade.

Quando se trata de floresta Atlântica no Nordeste do Brasil, a situação é preocupante. A floresta Atlântica do Nordeste do Brasil é considerada uma das regiões mais críticas do mundo. A floresta Atlântica do Nordeste do Brasil é considerada uma das regiões mais críticas do mundo.

Para reverter o processo de degradação e promover o desenvolvimento sustentável, é necessário adotar medidas que promovam a conservação e a restauração da floresta. A conservação e a restauração da floresta são essenciais para a manutenção da biodiversidade e da cultura ancestral.





Muda
Nordeste

**Associação Nordestina de Produtores
de Mudanças**

DIRETORIA:



Gunnar Jorg Kelsch
PRESIDENTE



Antônio Campos de Lacerda
VICE PRESIDENTE



Jobson Barros Ludgério
TESOUREIRO



José Umberto de Menezes Lira
CONSELHO FISCAL



Paulo Sebastião da Silva
CONSELHO FISCAL



Gilberto José dos Santos Vasconcelos
CONSELHO FISCAL





Severino Rodrigo Ribeiro Pinto, Biól, Dr.
severino@cepan.org.br